

Tablo 3. Serum biyokimya deęerleri

| | Normotansif | Kronik Hipertansiyon | Geçici Hipertansiyon | Kronik Hipertansiyon Preeklampsi | Preeklampsi |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|
| | (N=26) | (N=1) | (Naİl) | (N=3) | (N=30) |
| Ürik asit (mg/dl) | 3.8±1.1 | 4 | 4.24±1.7 | 7.0512.2* | 5.3*3.2* |
| Kreatinin (mg/dl) | 0.5±0.1 | 1.07 | 0.59±0.39 | 1.18±0.17 | 0.86±0.52 |
| AST(Ü) | 22.8±8 | 15 | 17.5±5.8 | 24.3±7.4 | 28.8±8.3 |
| ALT(Ü) | 20.7±8 | 10 | 17±5.2 | 22.7±6 | 25.2±5.4 |
| Trombosit | 249.8±69 | 262 | 180±87 | 265±60 | 211 ±70 |
| Total bilirubin (mg/dl) | 0.65±0.17 | 1.3 | 0.44±0.3 | 0.57±0.2 | 0.51 ±0.2 |
| Üre (mg/dl) | 29±9.5 | 17 | 22.4±7 | 44.3±10 | 27±10 |

* $p < 0.01$; Normotansif, kronik hipertansiyon ve geçici hipertansif gebeler ile karşılaştırıldığında