

Tablo 4. Gebelik öncesi ve gebelikte sigara içme

| Karakteristik | SGA (N=40) | | AGA (N=381) | |
|--|------------|------|-------------|------|
| | Sayı | % | Sayı | Sayı |
| Gebelik öncesi sigara içme ($\chi^2=0.2, p>0.05$) | | | | |
| Evet | 16 | 40.0 | 132 | 34.2 |
| Hayır | 24 | 60.0 | 248 | 65.3 |
| Süre ($\chi^2=2.6, p>0.05$) | | | | |
| >5yıl | 11 | 68.8 | 58 | 43.9 |
| =<5 yıl | 5 | 31.2 | 74 | 56.1 |
| Sayı($\chi^2=0.1, p>0.05$) | | | | |
| >10 | 11 | 68.8 | 100 | 75.8 |
| =<10 | 5 | 31.2 | 32 | 24.2 |
| Gebelikte sigara içme ($\chi^2=0.4, p>0.05$) | | | | |
| Evet | 9 | 22.5 | 65 | 17.1 |
| Hayır | 31 | 77.5 | 315 | 82.9 |
| Süre($\chi^2=0.1, p>0.05$) | | | | |
| 3-6 ay | 5 | 55.5 | 36 | 55.4 |
| Gebelik boyunca | 4 | 44.5 | 29 | 44.6 |
| Sayı ($\chi^2=0.7, p>0.05$) | | | | |
| 1-5 | 8 | 88.8 | 56 | 86.2 |
| =>6 | 1 | 21.2 | 9 | 13.8 |