

Tablo 1. Obstetrik Acillerde Nitrogliserin'in Kullanıldığı Olgular ve Endikasyonları

Hasta	Yaş	Parite	Gest. hafta	Olgu	Fetüs ağırlığı (g.)	Total NTG dozu (mg)	Giriş TA	Minimal TA	Kan kaybı (ml)	Apgar skoru	Komplikasyon
1	36	8	40	Plasenta retansiyonu	-	400	130/80	120/80	<500	-	-
2	25	2	40	Makadi doğum baş takılması	3750	200	130/100	130/90	<500	-	-
3	30	0	35	İkiz gebelik, nonverteks 2.bebek	2500	300	170/100	140/90	<500	5/8	-
4	40	7	35	Makadi doğum, baş takılması	2500	300	130/70	130/60	<500	4/8	-
5	20	1	39	Plasenta retansiyonu	-	200	140/90	130/60	<500	-	-
6	20	1	39	Makadi doğum, baş takılması	3800	200	140/100	140/90	<500	5/10	-
7	21	1	34	İkiz gebelik, nonverteks 2.bebek	2400	300	140/90	140/90	<500	6/10	-
8	22	1	36	İkiz gebelik, nonverteks 2.bebek	3100	300	120/80	110/70	<500	7/10	-
9	23	1	35	Makadi doğum, baş takılması	2600	400	130/80	100/60	<500	4/8	-
10	25	2	34	İkiz gebelik, nonverteks 2.bebek	2550	300	120/80	110/70	<500	7/10	-
11	29	7	37	Plasenta retansiyonu	-	400	140/90	120/90	<500	-	-
12	28	4	39	Plasenta retansiyonu	-	400	130/80	130/80	<500	-	-