

Tablo 8. HELLP sendromu olgularında laboratuvar bulgularına göre perinatal komplikasyon oranları.

	Perinatal komplikasyon var n (%)	Perinatal komplikasyon yok n (%)	P değeri	OR (%95 CI)
Trombosit< 70000 (/mm ³)	12(%60)	2(%40)	0.420	1.4(0.1-14.1)
Trombosit> 70000 (/mm ³)	8(%40)	3(%60)		
AST >400 (IU/l)	7(%35)	1(%20)	0.520	1.3(0.9-18.8)
AST<400 (IU/ l)	13(%65)	4(%80)		
ALT >400 (IU/l)	6(%30)	1(%20)	0.0.659	1.1(0.8-14.7)
ALT <400 (IU/l)	14(%70)	4(%80)		
LDH >1400 (IU/l)	10(%50)	2(%40)	0.870	1.5(0.2-11.3)
LDH <1400 (IU/l)	10(%50)	3(%60)		
Protrombin zamanı >14 (sn)	5(%25)	1(%20)	0.815	0.6(0.3-11.5)
Protrombin zamanı <14 (sn)	15(%75)	4(%80)		
Fibrinojen <200mgr/dl	10(%50)	0	0.041	
Fibrinojen >200 mgr/dl	10(%50)	5(%100)		
Kreatinin >2 mg/dl	4(%20)	0	0.008	
Kreatinin <2 mg/dl	16(%80)	5(%100)		

Değerler ortalama (x) ± Standart sapma (Sx), n % ve Odds Ratio (Parantez içinde %95 seviyede Güven Aralığı) olarak verildi.